

NORSTAR

STOPP BLØDNINGEN

Ved kritisk blodtap må du handle så raskt som mulig for å bevare så mye blod i kroppen som mulig. Her får du vite hvorfor.

BLODETS FUNKSJONER

- Transportere oksygen til cellene
- Distribuere varme
- Transportere avfallsstoffer (f.eks. CO₂)
- Transportere hormoner
- Transportere næringsstoffer

BLODVOLUM




60kg: 4.8l

70kg: 5.6l

90kg: 7.2l

DØDSTREKANT VED BLØDNING




Hypovolemisk sjokk og død kan inntreffe ved blodtap på 30% eller mer av blodvolum. Bevissthetstap vil skje før dette.



Last ned på norstar.ch/resources

BLODTAP

med kritisk blødning i arterie



BRACHIALIS (arm)

8-12ml

pr. hjerteslag

0.8-1.2l

/ minute

FEMORALIS (bein)

14-20ml

pr. hjerteslag

1.4-2.0l

/ minute



Grunnet vasokonstriksjon (sammentrekning av blodårer) vil såret sannsynligvis ikke blø så mye innledningsvis. Denne effekten vil avta etter noen få sekunder.

*Eksempelet bruker en puls på 100 slag pr. minutt, noe som er relativt lavt under stress.