

NORSTAR



ЗАУСТАВИ КРВАРЕЊЕ

У случају критичног губитка крви, желите да делујете брзо како би сачували што више крви у телу.
Неколико добрих разлога зашто:

ФУНКЦИЈЕ КРВИ

- Доноси кисеоник ћелијама
- Шири топлоту
- Транспортује отпадне продукте (нпр. CO₂)
- Транспортује хормоне
- Транспортује нутријенте

КОЛИЧИНА КРВИ



60кг: 4.8л
70кг: 5.6л
90кг: 7.2л

ТРИЈАДА СМРТИ

КОАГУЛОПАТИЈА
Проблем згрушавања крви

СМАЊЕНА КОАГУЛАЦИЈА

ВИШЕ МЛЕЧНЕ КИСЕЛИНЕ У КРВИ

УСПОРЕН РАД СРЦА

ХИПОТЕРМИЈА
Ниска телесна температура

АЦИДОЗА
Кисела крв



Хиповолемијски шок и смрт могу настати ако изгубите 30% или више крви. Несвестица ће се догодити раније.



Преузми на
norstar.ch/resources

ГУБИТАК КРВИ

са катастрофалном повредом артерије

BRACHIALIS (рука)

8-12мл

по откуцају

0.8-1.2л

/ минут

FEMORALIS (нога)

14-20мл

по откуцају

1.4-2.0л

/ минут



Због вазоконстрикције (скупљање крвних судова) рана можда неће много крварити у почетку. Ефекат ће престати после пар секунди.

* Пример направљен са релативно малим бројем откуцаја (под стресом) од 100 откуцаја у минути.

