

NORSTAR



STOPPA BLÖDNINGEN

Vid en kritisk blodförlust måste du agera snabbt för att behålla så mycket blod som möjligt. Här får du veta varför.

BLODETS FUNKTIONER

- Transportera syre till kroppens celler
- Värma kroppen
- Transportera bort restprodukter (t.ex. CO₂)
- Transportera hormoner
- Transportera näringsämnen

BLODVOLYM




60kg: **4.8l**

70kg: **5.6l**

90kg: **7.2l**

DÖDENS TRIAD




Blödningschock eller död kan inträffa om du förlorar 30% eller mer av din totala blodvolym. Medvetslöshet inträffar före det.



Ladda ner den på norstar.ch/resources

BLODFÖRLUST

vid en katastrofblödning i artären



BRACHIALIS (armen)

8-12ml

per hjärtslag

0.8-1.2l

/ minut


FEMORALIS (benet)

14-20ml

per hjärtslag

1.4-2.0l

/ minut



På grund av vasokonstriktion (sammandragning av blodkärlen) så kan skadan blöda ganska lite inledningsvis. Denna effekt avtar dock efter några sekunder

* Detta exempel utgår från en ganska låg hjärtfrekvens (under 100 slag/min) för någon som är stressad.